


- . Seuls les patients en bonne santé peuvent entrer
- . En cas de rhume, de fièvre, de douleur corporelle, de toux ou d'effets gustatifs, le traitement doit être différé de 3 semaines.
- . Les patients à risque doivent rester à la maison
- . Quarantaine minimum de 3 semaines et sans contact avec personnes à risque



- Désinfection :**
- . des moyens de paiement
 - . des toilettes
 - . des entrées/sorties labo
 - . de la banque accueil
 - . des surfaces touchées



- 2**
- . Lavage des mains
 - . Désinfection Gel HA
 - . Masque #chir perso
 - . température patients



Airborne



- 3**
- . Maximum 4 personnes en salle d'attente avec masques
 - . Pas d'accompagnant
 - . Solution hydro-alcoolique à disposition
 - . Suppression des magazines
 - . Poignées de portes désinfectées

Susceptible individuals



Direct contact



Indirect contact

- . Lavage des mains
- . Désinfection Gel HA
- . Masque,
- . Lunettes,
- . Visière,
- . Gants
- durant les soins et pendant les phases de décontamination et d'asepsie

- 4**
- . Plateau technique préparé à l'avance
 - . Travail à 4 mains idem protocole stérile chir
 - . Zone propre / Zone contaminée

- . Digue si possible
- . Aspi +++
- . Spray - - -

Contaminated surfaces

- 5**
- Effets personnels du patients:
- En salle de soins : déposés sur la chaise plastique
 - > désinfection de surface après séance
 - En chirurgie : cintre + tablette + clé
 - > désinfection du casier après séance
- . Aération de la salle pendant 10 minutes
 - . Désinfection des surfaces
 - . Purge des sprays
 - . Désinfection des poignées
 - . Protocoles de stérilisation habituels